

RICERCA "ALLO" ANTICORPI ANTIPIASTRINE

L'esame è da effettuarsi:

- in pazienti politrasfusi che hanno presentato reazioni o documentata refrattarietà alle trasfusioni di PLT
- in pazienti con numero di PLT < 100.000/ μ l in assenza di emorragie o terapia citostatica.

Riempire correttamente **una provetta di sangue 6 ml tappo viola (provette per la determinazione del gruppo sanguigno) o tappo rosso** riportando i dati anagrafici completi del paziente ed il reparto richiedente

Cognome _____ Nome _____ Data di nascita _____

Reparto _____

Diagnosi _____

Terapia in atto _____

Hb _____ RBC _____ WBC _____ PLT _____ in data _____

Ha effettuato terapie trasfusionali? Si No

Tipo emocomponente trasfuso EC PLT PF IgG

In caso di **pregressa trasfusione di PLT** il prelievo deve essere fatto almeno dopo 4 giorni dall'avvenuta trasfusione di PLT.

La ricerca degli "AUTO" ANTICORPI ANTIPIASTRINE non viene più eseguita

N.B. Per motivi di organizzazione interna il campione dovrà pervenire presso il **Laboratorio Analisi** dell'Ospedale S.Lazzaro di Alba **entro le ore 8 dal lunedì al venerdì**, in quanto il test viene eseguito dal Servizio Trasfusionale dell'ASO S. Croce di Cuneo.

Data _____

Il Medico di Reparto
