

Linee guida

La prevenzione degli
incidenti domestici in età infantile



Come si legge (NIEbP 2011)

- **Disegno dello studio/ livello di rilevanza**
 - 4. trial randomizzati controllati di buona qualità o una revisione di RCT
 - 3. RCT di qualità sub ottimale
 - 2. studio osservazionale di buona qualità quali studi di coorte, serie temporali interrotte (ITS) o revisione di studi osservazionali
 - 1. studio di qualità sub ottimale quali studi prima e dopo, o trasversali



Come si legge

- **Qualità della prova**

- +++++. la maggior parte dei criteri di qualità è soddisfatta
- +++. molti criteri soddisfatti
- ++. alcuni criteri soddisfatti
- +. pochi o nessun criterio soddisfatto



Come si legge

• Forza della raccomandazione

- A) l'esecuzione di quella particolare procedura o intervento è fortemente raccomandata. Indica una particolare raccomandazione sostenuta da prove scientifiche di buona qualità con un'adeguata rilevanza
- B) Si nutrono dei dubbi sul fatto che quella particolare procedura o intervento debba sempre essere raccomandata, ma si ritiene che la sua esecuzione debba essere attentamente considerata
- C) **esiste una sostanziale incertezza a favore o contro la raccomandazione di eseguire la procedura o intervento**



Tipologie di interventi

- 1) **Campagne di comunicazione**
- 2) **Interventi educativi con o senza fornitura di dispositivi di sicurezza**
- 3) **Programmi per lo sviluppo delle competenze genitoriali connesse alla prevenzione degli ID**
- 4) **Programmi scolastici**
- 5) **Interventi legislativi**
- 6) **Promozione di strategie a livello nazionale e locale**
- 7) **Sorveglianza e sistemi di monitoraggio**



Lista delle raccomandazioni: forza e destinatari

n.	Testo della raccomandazione	Livello di rilevanza	Qualità della prova	Forza della raccomandazione	destinatari
1	Le campagne di comunicazione che trasmettono raccomandazioni sono da associare a programmi sviluppati in specifici <i>setting</i> (interventi scolastici, visite domiciliari)	1	+	C	Ministeri, regioni, Dipartimenti di prevenzione, associazioni
2	E' necessario realizzare ulteriori studi in grado di valutare l'efficacia delle campagne di comunicazione nella riduzione degli ID al fine di produrre indicazioni specifiche su come svilupparle	3	+	B	Enti di ricerca, Università
3	Gli interventi informativi/educativi devono essere forniti alla popolazione pediatrica dando precedenza ai soggetti a rischio e sotto i 5 anni	2	++	B	AS, Infermieri, MMG, Dipartimento di Prevenzione, Distretto

Lista delle raccomandazioni: forza e destinatari

n.	Testo della raccomandazione	Livello di rilevanza	Qualità della prova	Forza della raccomandazione	destinatari
4	Quando possibile è opportuno associare l'intervento educativo alla fornitura gratuita o a prezzo ridotto di dispositivi di sicurezza	1	++++	A	AS, Infermieri, MMG, Dipartimento di Prevenzione, Distretto
5	Operatori adeguatamente formati dovrebbero condurre programmi per lo sviluppo delle competenze genitoriali in tema di sicurezza domestica specialmente indirizzate alle famiglie a rischio	2	++++	A	Pediatri, operatori sanitari e sociali in contatto con famiglie con bambini
6	Nella selezione delle famiglie cui rivolgere l'intervento sono da privilegiare quelle con bambini maggiormente a rischio di incorrere in ID	2	++++	A	Pediatri, operatori sanitari e sociali in contatto con famiglie con bambini

Lista delle raccomandazioni: forza e destinatari

n.	Testo della raccomandazione	Livello di rilevanza	Qualità della prova	Forza della raccomandazione	destinatari
7	E' necessario valutare l'effetto dei principali programmi di prevenzione degli ID in ambito scolastico attraverso disegni di studio appropriati	1	+	C	Ministero della salute, della Pubblica istruzione, ISS, Università, centri di ricerca, Dipartimenti di prevenzione in collaborazione con i servizi di epidemiologia delle ASL
8	Gli interventi legislativi sono utili nel ridurre l'esposizione a fattori di rischio per i bambini (eliminazione dal mercato e dalle casì di prodotto o elementi potenzialmente dannosi)	3	+++	A	Pediatri, operatori sanitari e sociali in contatto con famiglie con bambini
9	E' necessario promuovere coalizioni a livello locale tra decisori, professionisti e associazioni in grado di coordinare le attività di prevenzione, attirare le risorse necessarie per implementare e valutare i progressi nel tempo	2	++++	A	Dal livello nazionale al livello regionale

Lista delle raccomandazioni: forza e destinatari

n.	Testo della raccomandazione	Livello di rilevanza	Qualità della prova	Forza della raccomandazione	destinatari
10	E' necessario che il Ministero della salute promuova attività di ricerca per valutare gli effetti delle politiche e degli interventi di prevenzione degli incidenti domestici nei bambini	1	+	C	Ministero della salute, referenti regionali per la sorveglianza degli incidenti domestici
11	E' necessario promuovere e mantenere sistemi di sorveglianza degli ID con dati quanto più dettagliati a livello locale, e in grado di definire in modo specifico le caratteristiche delle popolazioni maggiormente colpite	3	+	C	Servizi di Epidemiologia delle Aziende sanitarie
	Riepilogo	5 1 3 2 3 3	6 + 1 ++ 1 +++ 3 +++++	5 A 2 B 4 C	

Selezione degli studi e risultati della ricerca

- **Selezionati linee guida e revisioni della letteratura pubblicate tra il 2001 e il 2014**
- **Complessivamente individuati 58 documenti:**
 - 5 linee guida
 - 36 revisioni sistematiche
 - 17 studi primari
- **Dopo la selezione sono stati incluse**
 - 2 linee guida
 - 4 revisioni sistematiche
 - 4 studi primari
 -

